

Floksin Oral

%10 Enrofloksasin

Bileşimi:

Her ml'de 100 mg Enrofloksasin baz içeren oral bir çözeltidir.

Kullanım yeri:

Etçi tavuklarda enrofloksasine duyarlı bakterilerden kaynaklanan enfeksiyonların sağıtımında kullanılır.

Bu kapsamda etçi tavuklarda Mycoplasmosis (CRD-Kronik

Solunum Yolu Hastalığı), Colibacillosis, Salmonellosis, Pasteurellosis, Staphylococcosis hastalıklarında endikedir.

Kullanım şekli ve Dozu:

Kanatlılarda 10 mg/kg c.a./gün dozu hesabıyla içme suyu içine uygulanır.

Su tüketimine bağlı olarak değişmekle birlikte, her 1000 kg c.a. için 100 ml Floksin 200 litre içme suyuna katılır. Tedaviye 3-5 gün devam edilmelidir. Salmonella ve Pasteurella türleri tarafından meydana getirilen enfeksiyonlarında 5-10 gün kullanılması tavsiye edilir. İlaçlı içme suyu günlük olarak hazırlanmalı ve kullanılmalıdır. Uygulama öncesi içme suyunun temiz olmasına ve asit karakter taşımamasına dikkat edilmelidir.

Enrofloksasin çözeltisi alkali ortamlarda daha stabil olduğundan uygulama temiz içme suyu ile yapılmalı ve hayvanlar akşamdan susuz bırakılarak ilaç 2 saat içinde içecekleri su miktarı içinde verilmelidir.

Ambalaj şekli:

100 ve 1000 ml