

Poultris Oral

Trimetoprim + Sülfametoksazol



Bileşimi:

Her ml'de 80 mg Trimetoprim, 400 mg Sülfametoksazol içeren oral bir süspansiyondur.

Kullanım yeri:

Etçi tavuk ve hindiler ile rumen aktivitesi başlamamış buzağı, kuzu ve oğlaklarda, duyarlı gram pozitif ve gram negatif bakterilerden kaynaklanan enfeksiyonların tedavisinde kullanılır. Buna göre;

Etçi tavuk ve hindlerde; Koliseptisemi, salpingitis, kolera, koriza ve stafilokok enfeksiyonlarında ve duyarlı bakteriler tarafından oluşturulan diğer enfeksiyonlarda,

Buzağı, kuzu ve oğlaklarda; Bakteriyel ishaller, gastro-enteritisler, koliseptisemi, bronkopnömoniler, buzağı differisi, göbek kordonu iltihapları, viral enfeksiyonların komplike olduğu sekonder bakteriyel enfeksiyonların tedavisinde endikedir.

Kullanım şekli ve Dozu:

Kombine farmakolojik dozu 16-32 mg/ kg c.a./gündür (Trimetoprim 80 mg/ml + Sülfametoksazol 400 mg/ml, toplam 480 mg/ml etken madde üzerinden). Bu doz günde 1-2 defa ve 3-5 gün süreyle uygulanmalıdır. Pratikte; Etçi tavuklarda ve hindilerde toplu sağaltım söz konusu olduğunda, ortalama her 450 kg c.a. için günde 15-30 ml Poultris Oral Süspansiyon içme suyuna katılarak uygulanır. Tedaviye 3-5 gün devam edilir. Rumen aktivitesi başlamamış buzağı, kuzu ve oğlaklarda ise günlük sağaltım dozu; 0,5-1 ml/15 kg c.a. olacak şekilde ayarlanır. Tedaviye 3-5 gün devam edilir. Günlük dozun ikiye bölünerek verilmesi tavsiye edilir.

Ambalaj şekli:

200 ml ve 1 litre